

## Voorzichtigheid vanwege ILT-uitbraken in Nederland en Klassieke Vogelpest in Polen

De laatste weken komen er meer en meer meldingen van uitbraken van infectieuze laryngotracheïtis (ILT) bij professionele pluimveehouders. ILT wordt gekenmerkt door een ernstige, vaak bloederige ontsteking van de luchtpijp. Pluimvee dat door ILT is aangetast, vertoont ernstige ademhalingsproblemen. Deze kenmerken zich door benauwdheid, rochelen en vaak het schudden met de kop. ILT kan leiden tot acute en hoge sterfte onder het pluimvee. Gelet op deze uitbraken in de professionele sector is nu ook extra waakzaamheid geboden bij hobbymatige pluimveehouders.

Verder zijn er recent enkele uitbraken van Klassieke Vogelpest in het midden van Polen vastgesteld. Het gaat om uitbraken bij professionele pluimveehouderijen. Vanwege het toenemende verkeer met Polen, bestaat er een kleine kans dat het Klassieke vogelpestvirus met transporten Nederland zou kunnen bereiken.

Vanwege deze ontwikkelingen roept de Nederlandse Bond van Hoender-, Dwerghoender-, Sier- en watervogel-houders (NHDB) alle hobbymatige houders van pluimvee en parkvogels op om nu extra zorgzaam te zijn. De NHDB vraagt om de eerdere gepubliceerde adviezen **op basis van vrijwilligheid zoveel mogelijk** op te volgen omdat deze in algemeenheid de gezondheid van hobbymatig gehouden pluimvee ten goede komen. De NHDB adviseert de volgende aanpak:

1. Voorkom, voor zover mogelijk, dat uw hobbymatig gehouden hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels in contact komen met, of in de buurt komen van professioneel gehouden pluimvee en met wilde vogels of de uitwerpselen daarvan.
2. Hou uw hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels op uw eigen erf of tuin en zo mogelijk in een hok of (buiten-)ren.
3. Laat alleen de verzorger van de hoenders, dwerghoenders, sier- en/of watervogels toe in het verblijf.
4. Voorkom dat de mest van uw hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels wordt verslept; verwissel uw schoenen en gebruik in het verblijf van uw pluimvee speciaal daarvoor bestemde rubberlaarzen.
5. Direct voor en na verzorging van de vogels dient u steeds uw handen grondig te wassen.
6. Probeer uw hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels zo weinig mogelijk te verplaatsen. Bij verplaatsing naar bijvoorbeeld een tentoonstelling, controleer de dieren dan extra op hun vitaliteit en gezondheid.
7. Indien u nieuwe hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels aanschaft, hou deze voor tenminste vier weken in een aparte ruimte en controleer daarvan dagelijks de vitaliteit, gezondheid en mest.
8. Probeer voor zover mogelijk na iedere schoonmaakbeurt van de hokken en rennen, de mest zo snel mogelijk af te voeren in goed gesloten zakken.
9. Als plotseling meerdere van uw vogels ernstig ziek worden of dood gaan, neem dan direct contact op met een (erkende pluimvee-)dierenarts.
10. In geval er hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels doodgaan, verpak de kadavers dan deugdelijk in een plastic zak en voer deze af.
11. Volg de actuele informatie uit het nieuws of op onze website [www.nhdb.nl](http://www.nhdb.nl). U kunt dan uw maatregelen afstemmen op deze actuele situatie.

Omdat hobbymatige houders van hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels op een extensieve manier en gescheiden van elkaar in kleine aantallen dieren houden, is het risico op besmetting verwaarloosbaar klein en door zorgvuldig te zijn moeten we dat zo houden. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

14 december 2007

Namens het bestuur van de NHDB

Voorzitter

Franc Beekmans